

UWAGA!!

RZEKOMY POMÓR DROBIU-

Choroba podlegająca zgłoszeniu i zwalczaniu

Rzekomy pomór drobiu (ang. **Newcastle disease**, **ND**) stanowi ogólnoświatowy problem dla branży drobiarskiej, powodując ogromne straty ekonomiczne w chowie i hodowli drobiu, co przekłada się na produkcję jaj i mięsa drobiowego.

Na zakażenie wirusem rzekomego pomoru drobiu wrażliwe są zarówno ptaki gospodarskie, domowe, jak i dzikie. Najbardziej wrażliwe są, przede wszystkim ptaki z gatunku **kura domowa** (*Gallus gallus*).

U indyków nie dochodzi do rozwoju ciężkich objawów klinicznych choroby. Wrażliwe na zakażenie są również strusie oraz **gołębie**.

Jest to jednostka chorobowa, która podlega obowiązkowemu zwalczaniu i wszystkie państwa członkowskie UE zobowiązane są do podjęcia natychmiastowych środków mających na celu likwidację ognisk tej choroby.

W przebiegu ND, obserwuje się następujące objawy kliniczne:

- > sapanie, kaszel, kichanie i rzęzenie;
 - > drżenia mięśni, paraliż skrzydeł i kończyn dolnych, nienaturalnie skrzycona szyja (torticollis);
 - > biegunka (często zielonkawa).
- u kur niosek - spadek nieśności oraz nieprawidłowości w budowie jaj (nietypowy kształt, odbarwienie skorup, a także tzw. „łanie jaj”, czyli składanie jaj bez skorup)




A



B



C



D

HODOWCO!!!!!!!

**Zapytaj lekarza weterynarii o możliwość szczepienia swojego stada
przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu**

CHOROBA ZWALCZANA Z URZĘDU

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRYZAGRODOWY

- > karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
- > utrzymywanie drobiu w izolacji od dzikich ptaków LUB W ZAMKNIĘCIU!!!!
- > odizolowanie od innego drobiu, kaczek, gęsi oraz GOŁĘBI ;
- > przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem i gryzoniami;
- > unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
- > zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
- > po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
- > używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

- > karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
- > przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

DODATKOWE ZALECENIA

- > słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyc itp.);
- > należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
- > należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
- > nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
- > nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa

Posiadacz drobiu powinien zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

- zwiększona śmiertelność;
- spadek nieśności, zmiany w strukturze jaj (jaja bez skorup)
- znaczący spadek pobierania paszy i wody;
- objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność do ruchu;
- duszność;

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej

ul. Karpacka 76, 43-316 Bielsko-Biała

tel.: (33) 496-01-80 www.piw.bielsko.pl

e-mail: sekretariat@bip-bielsko.pl